



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

عملية الختان لحديثي
الولادة والأطفال
Infant circumcision



ماهي الطرق المستخدمة لختان الأطفال ؟

هناك ٣ طرق : (الرجاء إضافة صورة)

١- استخدام مشبك **جومكو (Gomco)** حيث يتم إزالة الجلد الزائد في لحظتها بدون وجود أي حلقات على الذكر بعد العملية.

٢- استخدام حلقة بلاستيكية (**Plastibell**) على الجلد الزائد في الذكر وتعمل على منع وصول الدم إلى الجلد الزائد مما يؤدي إلى سقوطه تدريجياً بعد **٥ إلى ١٠ أيام**. يتغير لون الجلد حول الحلقة إلى بني غامق أو أسود ويعد أمراً طبيعياً إلى حين سقوط الحلقة بالجلد الأسود الميت.

صورة توضيحية تبين شكل الذكر

لطفلك بعد عملية الختان في حال

إستعمال الحلقة البلاستيكية



٣- إزالة جراحية للجلد الزائد تحت التخدير العام.

ما هي تعليمات ما قبل عملية الختان ؟



- حمم طفلك كالمعتاد في صباح العملية .إغسل جيداً منطقة الذكر وما جاورها.



- قبل عملية الختان مباشرة قم بتغيير حفاظ طفلك
- قم بإحضار حفاظ آخر نظيف للإستعمال ما بعد عملية الختان.



- يستطيع طفلك أن يرضع بشكل طبيعي إلى ما قبل العملية بساعة.



- قم بإحضار لهاية (مصاصة) لطفلك.

ماذا بعد عملية الختان؟

الإستحمام

- يوم العملية، لا يستلزم عمل مغاطس مائية.



- أول يوم بعد العملية، يبدأ الطفل بعمل

مغاتس مائية دافئة للمنطقة لمدة ١٠

دقيقة، ٢-٣ مرات باليوم يتم تجفيف الذكر

ووضع المرهم على الجرح وذلك لمدة أسبوع.

- في حال إستخدام الجومكو فقط (يتم سحب الجلد بشكل

خفيف إلى تحت رأس العضو الذكري لتجنب الإلتصاقات

الجلدية بعد ١٠ أيام من الختان .

- تستطيع تحميم طفلك في حال وجود براز على منطقة

العملية أو في حال صعوبة التبول لدى الطفل.

- من المتوقع سقوط الحلقة في خلال ٧-١٢ يوم.

ماذا بعد عملية الختان؟

الحفاظ



- قم بتغيير حفاظ طفلك في أسرع وقت ممكن في حال إتساخه.

الألم



- أعط طفلك شراب أو تحميلة مسكن للألم حسب تعليمات الطبيب .

النشاط والحركة والعودة للمدرسة



- تجنب وضع أي ضغط على منطقة الذكر .
تأكد أن حزام أمان كرسي الطفل في السيارة غير مشدود بقوة بين فخذي الطفل.
- يستطيع الطفل الأكل والشرب بعد الإجراء

مباشرة للمخدر الموضعي، **بعد ساعتين**


للتخدير العام في حال عدم وجود رغبة في

التقيؤ.



ماذا يجب علي أن ألاحظ؟

النزيف



من الطبيعي وجود القليل من الدم في حفاظة طفلك لعدة ساعات بعد عملية الختان وكذلك بعد سقوط الحلقة البلاستيكية في حال إستعمالها. في حال إستمرار النزيف بغزارة الرجاء الضغط على الجرح بإستخدام شاش أو منشفة نظيفة والتوجه مباشرةً إلى الطوارئ .

الالتهاب

من الطبيعي وجود تورم وكدمات في الذكر في الأسابيع الأولى بعد عملية الختان .من المحتمل أن يحتاج التورم عدة شهور حتى يختفي بالكامل .

في حال إزدياد التورم مع وجود (إحمرار، ألم أو حرارة أكثر

من ٣٨,٥ درجة مئوية) قم بإستشارة طبيبك أو زيارة



الطوارئ للتأكد من عدم وجود إلتهاب.

ملاحظة :



سيكون غشاء أصفر خفيف على الجرح مما يعد أمراً طبيعياً أثناء عملية التئام الجرح ويختلف عن الصديد (الصديد يكون سائلاً ومصاحب لتورم وألم وإنتفاخ في الجرح)

- في حال عمل إزالة جراحية للجلد يتم عمل غرز جراحية تذوب خلال ٢-٣ أشهر.

متى تتصل بطبيبك؟



قم بالارتباط على قسم جراحة المسالك البولية
بمستشفى الملك فهد الجامعي



رقم : ١٣٨٩٦٦٦٦٦٦ . **تحويلة : ٢٠١٢**

خلال أوقات الدوام الرسمي , أو توجه الى قسم الطوارئ:


في حالة وجود إحدى الحالات التالية:



١. نزيف مستمر وبكميات غزيرة.



٢. إزدیاد تورم الذکر مع وجود إحمراء وسخونة في
منطقة العملية أو في حال وجود إفرازات
صفراء سائلة من منطقة العملية



٣. إرتفاع درجة حرارة طفلك أو وجود ألم مستمر



٤. عدم تبول طفلك خلال ال ١٢ ساعة الأولى بعد
العملية



٥. عدم سقوط الحلقة البلاستيكية خلال ١٢ يوماً من
العملية

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين قسم المسالك البولية
بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم التوعية الصحية

IAU-20-42



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University