




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY


مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

تمدد الشريان الأبهري البطني

Abdominal Aortic Aneurysm




ماهو تمدد الشريان الأبهر البطني؟




هو عبارة عن تمدد الشريان بـ 50% على الأقل فوق قطره الطبيعي، وقد يصل توسع القطر في الشريان الأبهر البطني إلى أكثر من 3 سم.

يصاب نحو 50% من الأشخاص الذين بلغوا سن الخمسين عاماً وما فوق بتمدد الشريان الأبهر البطني، وهو أكثر انتشاراً بين الرجال منه لدى النساء، وقد يصيب تسعة رجال مقابل امرأة واحدة (9 : 1).



ماهي أعراض تمدد الشريان الأبهر البطني؟



معظم حالات تمدد الشريان الأبهر البطني لا تصاحبها أية أعراض وقد يتم تشخيصها بالصدفة عن طريق الفحوصات التصويرية التي يتم إجراؤها لأسباب أخرى.



عند حدوث تمزق أو تمدد بجدار الأوعية الدموية، يبدأ المريض بالشعور بآلام البطن التي تمتد وتنتقل إلى الظهر، كما يشعر بتغيرات ديناميكية دموية، ومن الممكن أن نصادف ونلمس كتلة حساسة ونابضة خلال إجراء الفحص البطني.

ماهي أعراض تمدد الشريان الأبهر البطني؟




الحمى



ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء



انخفاض الوزن



زيادة عملية ترسب كريات الدم الحمراء تشير
لحصول توسع التهابي أو تلوث في الشريان
الأبهر البطني.

ماهي أسباب وعوامل الخطر لتمدد الشريان الأبهر

البطني؟

قد يعتقد البعض بأن تصلب الشرايين هو المسبب الرئيسي لهذا المرض ويعتقد البعض الآخر أن هناك العديد من المسببات التي تؤدي لضعف جدران الأوعية الدموية، من بينها:



○ العوامل الوراثية



○ فرط ضغط الدم



○ الالتهابات وفي بعض الحالات النادرة قد يكون السبب تلوث يصيب جدار الشرايين.

تنبيه:



من الممكن أن تتعرض حياة المريض للخطر بسبب تمزق الجدار وحصول نزيف.

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم التوعية الصحية

IAU-20-86



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University