



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية
"الاباداسيتنيب"
Psoriasis Treatments
"Upadacitinib"



كيف يعمل علاج الابداسيتنيب؟

يعمل على تقليل عمل جهاز المناعة عن طريق تثبيط إشارات JAK1 والتي تُحفّز الالتهاب في الصدفية وبذلك يُساهم الدواء في تقليل الالتهاب والاحمرار والتورم والحكة.

ما هي دواعي استعمال العلاج؟

- التهاب المفاصل الصدفي

كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

أقراص فموية بتركيزات ساعة: ١٥ ملغ و ٣٠ ملغ.



ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- تُبتلع الأقراص كاملة مع الطعام أو بدونه.
- غالبًا ما تكون الجرعة ١٥ ملغ مرة واحدة يوميًا.

ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

- خذ الجرعة عند التذكُّر.
- إذا اقترب موعد الجرعة التالية تجاوز الجرعة الفائتة.
- لا تُضاعف الجرعة لتعويض الفائتة.



ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب الأنف والبلعوم.
- زيادة خطر الإصابة بعدوى خطيرة مثل: الهربس (Shingles) أو الدرن.
- نقص في عدد خلايا الدم البيضاء والهيموجلوبين.

هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- الفحوصات الأساسية: فحص الدرن الخامل (الكامن) أو النشاط والتحقق من عدم وجود أي عدوى نشطة قبل بدء العلاج.
- اللقاحات: إكمال التطعيمات اللازمة تحت إشراف طبي قبل بدء العلاج ويجب تجنب اللقاحات الحية أثناء فترة العلاج.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب

من قبل قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-694



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University