



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية "إيكسكزوماب" Ixezumab



كيف يعمل إيكسكزوماب؟

إيكسكزوماب أحد الأدوية البيولوجية ويستهدف بشكل أساسي Interleukin-17A) وهو أحد العوامل الأساسية في الالتهابات التي تساهم في تطوّر الصدفية.

يقلل هذا الدواء من الالتهاب والنمو المفرط لخلايا الجلد الذي يميز الصدفية.

ما هي دواعي استعمال إيكسكزوماب؟

- يُستعمل لعلاج الصدفية اللويحية المتوسطة إلى الشديدة لدى البالغين.
- الصدفية الحمراء.
- الصدفية البشرية المعممة.



كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

حقن تحت الجلد (٨. ملغ/مل).

كيف يتم استخدام العلاج؟

- ❖ **الجرعة الابتدائية:** ١٦ ملغ (حقنتان من ٨ ملغ) في الأسبوع.
- ❖ **الجرعات التالية:** ٨ ملغ كل أسبوعين من الأسبوع ٢ حتى الأسبوع ١٢ وبعد ذلك ٨ ملغ كل ٤ أسابيع.
- ❖ تُحقن تحت الجلد في الفخذ أو البطن أو الذراع العلوي.
- ❖ يجب تغيير مواضع الحقن لتقليل التهيج.
- ❖ يُحفظ في الثلاجة.



ماذا أفعل في حال نسيان الجرعة؟

تُعطى الجرعة الفائتة في أقرب وقت ممكن ثم يُستأنف الجدول المنتظم .

لا تُضاعف الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ألم أو تورّم في موضع الحقن.
- التهابات الجهاز التنفسي.
- عدوى فطرية.



هل هناك أي تعليمات خاصة قبل البدء بالعلاج؟

الفحوصات الأساسية:

- فحص الدرن الخامل (الكامن) أو النشط.
- التحقق من عدم وجود أي عدوى نشطة قبل بدء العلاج.

اللقاحات:

- إكمال التطعيمات اللازمة تحت إشراف طبي قبل بدء العلاج.
- يجب تجنب اللقاحات الحية أثناء فترة العلاج.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل

قسم الخدمات الصيدلية بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-696



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University