



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

علاجات الصدفية
"أداليموماب"
Psoriasis Treatments
"Adalimumab"



كيف يعمل علاج أداليموماب؟

عبارة عن دواء بيولوجي يعمل على تثبيط (TNF) أحد البروتينات المسؤولة عن عمليات الالتهاب بذلك يساعد هذا الدواء في تقليل الالتهاب وإبطاء معدل تجدد خلايا الجلد المفرط في الصدفية مما يُحسن الأعراض مثل الاحمرار والقشور والتهيج.

ما هي دواعي استعمال العلاج في الصدفية؟

- ❖ الحالات المزمنة المتوسطة إلى الشديدة من اللويحات الصدفية عند البالغين.
- ❖ اللويحات الصدفية الشديدة عند الأطفال والمراهقين الذين يتراوح عمرهم بين ٤ و ١٧ سنة والذين ثبت أن العلاج الموضعي والعلاجات الضوئية لديهم كانت غير مناسبة أو غير مجدية.



كيف يكون شكل العلاج الصيدلاني؟

حقن تحت الجلد . ٢ ملغ و . ٤ ملغ.

ما هي طريقة استخدام العلاج؟

- ✓ احتفظ بالدواء في الثلاجة درجة حرارة ٢ - ٨ درجة مئوية.
- ✓ احتفظ بالدواء في علبته الأصلية لحمايته من الضوء.
- ✓ يجب إخراج الدواء من الثلاجة قبل ١٥ - ٣٠ دقيقة قبل الجرعة.
- ✓ احرص على تغيير مواقع الحقن في كل مرة.
- ✓ لا تحقن الدواء في المناطق المتأثرة بالصدفية.
- ✓ من المهم غسل اليد بالماء والصابون قبل أخذ الجرعة.
- ✓ استخدم مسحة طبية لتعقيم مكان الحقن.
- ✓ احقن الدواء بزاوية عمودية في حين استخدام الأقلام المعبأة مسبقًا.



ماذا أفعل في حال نسيت الجرعة؟

- ❖ عند نسيان الجرعة فعليك أخذها وقت تذكرها مباشرة.
- ❖ تؤخذ الجرعة التي تليها في وقتها المحدد مسبقًا.

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للعلاج؟

- ❖ احمرار أو تورّم أو حكة وألم في موقع الحقن.
- ❖ علامات عدوى كالحمّى والشعور بالغثيان. أو حرقة عند التبوّل
- ❖ إضافة إلى أعراض عدوى الجهاز التنفسي.
- ❖ صداع.
- ❖ شعور بالغثيان وألم بالبطن.
- ❖ آلام بالجهاز العضلي.



هل يوجد تعليمات خاصة قبل بدء العلاج؟

- من الواجب عدم ألا تعطى اللقاحات الحية خلال ٤ أسابيع من تاريخ البدء بالعلاج.
- قبل البدء بالعلاج وخلالها يتم التأكد من عدم وجود عدوى (كامنة أو حاليّة) الدرّن أو التهابات الكبد الوبائي (ب و ج) أو فيروس نقص المناعة المكتسبة.
- يتم التأكد قبل البدء بالعلاج من خلوّ المريض من مشاكل العقد اللمفاوية أو الفشل القلبي أو أي من الأمراض العصبية.
- يتم عمل مجموعة من التحاليل الطبية قبل البدء بالعلاج وخلالها على فترات مقرّرة وكلما دعت الحالة الطبية لذلك ومنها: تعداد كامل للدم (CBC) وفحوصات شاملة للأبيض وكذلك اختبارات الكبد الوبائي.
- يتم التأكد من تحليل الحمل قبل البدء بالعلاج.

المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل قسم الخدمات الصيدلية

بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر.

قسم الخدمات الصيدلانية

وحدة التوعية الصحية

IAU-25-706



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University