



تصوير شبكية العين باستخدام صبغة الفلوريسين

الإجراء:

- ◀ يتم تنفيذ الإجراء عن طريق حقن صبغة الفلوريسين في الوريد، ثم يتم التقاط سلسلة من الصور لشبكية العين باستخدام جهاز التصوير.
- ◀ الآثار الجانبية المصاحبة للإجراء قد تشمل:

- الغثيان و القيء
- الطفح الجلدي، والحكة.
- في حالات نادرة جدًا قد يحدث رد فعل تحسسي شديد.

تعليمات قبل الإجراء:

- ◀ ينصح بالصيام عن الأكل لمدة خمس ساعات قبل الإجراء ويجب على المريض أن يستمر في تناول الأدوية كالمعتاد.
- ◀ يرجى إبلاغ الطبيب والفريق الطبي عن وجود أي حساسية سابقة لأي مواد أو أدوية أو أطعمة.
- ◀ يرجى إبلاغ الطبيب والفريق الطبي عن وجود أي أمراض مزمنة عمومًا وخاصة أمراض الكلى.
- ◀ يرجى إبلاغ الطبيب والفريق الطبي في حال وجود حمل أو رضاعة.

تعليمات بعد الإجراء:

- ◀ قد تلاحظ بعد الإجراء تغير لون البول إلى اللون الأصفر لمدة أربعة وعشرون ساعة.
- ◀ ينصح بزيادة تناول الماء والسوائل في الـ 24 ساعة الأولى.
- ◀ يرجى حضور موعد المتابعة مع الطبيب المجدول لمناقشة نتائج التصوير.