




جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University



## أهمية الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم

- تحسين تشخيص المرض عن طريق تحديد المرحلة مبكرًا.
- يسهم في العلاج وبشكل أسهل والنتيجة معدل وفيات أقل من الاكتشاف المتأخر.
- اكتشاف وإزالة الأورام الحميدة قبل أن تتطور إلى سرطان القولون والمستقيم.
- تحديد مستوى خطر إصابة المريض بسرطان القولون والمستقيم إبتداءً من عمر 20 عام

## تقسيم العمر لإجراء الفحص المبكر

مريض عالي  
الخطورة:

40 عام  
أو 10 سنوات قبل تشخيص  
أصغر فرد مشخص بسرطان  
القولون والمستقيم

مريض متوسط  
الخطورة:

50-45 عام

سن  
الفحص  
المبكر

79 الى 85 عام

75 عام


سن التوقف  
عن الفحص  
المبكر



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل  
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي  
King Fahad Hospital The University

## أنواع الفحوصات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم




### منظار القولون:

- كل 10 سنوات لمرضى الخطورة المتوسطة
  - كل 5 سنوات لمرضى الخطورة العالية،
  - كل 3 سنوات في حال إكتشاف خصائص المرض
- يعد أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم بين الفحوصات الأخرى.

### فحوصات البراز المخبرية:

فحوصات سنوية للبراز في حال عدم القدرة أو الرغبة في إجراء المنظار (FIT +FOBT)  
ولكن تتطلب عمل فحص بالمنظار في حال كانت النتيجة إيجابية.



### أشعة القولون المقطعية:

كل 5 سنوات

ثاني افضل فحص مبكر بعد تنظير القولون  
يستخدم لكبار السن ذوي الامراض المزمنة  
(كأمراض القلب والرئة، السكري والجلطات)

