



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University

الخصية المعلقة

Undescended Testicle



ما هي الخصية المعلقة؟

تتخلق الخصية الطبيعية في الظهر وتنزل في كيس الصفن قبل ولادة الطفل. الخصية الغير نازلة أو المختفية أو الهاجرة أو المعلقة وهي التي فشلت في النزول إلى مكانها الطبيعي في كيس الصفن هي حالة غير نادرة وتحصل في 1 من كل ٢٥ مولودًا من الذكور.

ما هي أسباب الخصية المعلقة؟

لا يوجد سبب واضح حيث أن معظم الأطفال يكونون بصحة جيدة ولكن حدوثها يزيد عند الأطفال الخدج والمواليد بأوزان ضعيفة أو مع حالة مشابهة في العائلة.



كيف يتم تشخيص الخصية المعلقة؟

عن طريق الفحص الإكلينيكي بواسطة طبيب متمكن وقد تكون محسوسة أو غير محسوسة (داخل البطن) لا يوجد حاجة لأي تحاليل أو أشعة من أجل التشخيص.

كيف يمكن علاج الخصية المعلقة؟

معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة حيث إن الخصية تستمر في النزول الكامل إلى كيس الصفن في أول ٣ - ٦ أشهر ولكن في حال عدم نزولها للكيس بعد ٦ أشهر من الولادة والذي قد يحصل في ١ من كل ١٠٠ طفل مولود بهذه الحالة فإنه يتوجب عمل الجراحة لإنزالها وتثبيتها في كيس الصفن قبل عمر السنة.



ماذا يحدث في حال تأخير الجراحة؟

تتأثر وظيفة الهرمونات الذكورية والخصوبة.

ما هي أنواع جراحة الخصية المعلقة؟

المناظير في حالة الخصية غير المحسوسة بالفحص الإكلينيكي
الفتح في حالة الخصية المحسوسة بالفحص الإكلينيكي.

ما هي الخصية النطاطة؟

هي الخصية التي تتحرك إلى الأعلى ولا تستقر في كيس الصفن مدة طويلة، تحتاج الملاحظة إلى **عمر ٤-٥ سنوات** وفي حال عدم نزولها فإنه يتم تثبيتها في كيس الصفن جراحيًا.



المصادر والمراجع:

جميع الصور التوضيحية من [canva.com](https://www.canva.com)

المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريي جراحة الأطفال

بمستشفى الملك فهد الجامعي.

قسم جراحة الأطفال
وحدة التوعية الصحية
IAU-23-459



جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

مستشفى الملك فهد الجامعي
King Fahad Hospital The University